

## Evidence-Based Practice Attitude Scale

EBPAS<sup>©</sup> Gregory A. Aarons, Ph.D.

Vertaling: A.M.S. van Sonsbeek en B.G. Tiemens (2011)

Reference: Aarons, G. A. (2004). Mental health provider attitudes toward adoption of evidence-based practice: The Evidence-Based Practice Attitude Scale. *Mental Health Services Research*, 6(2), 61-74.

De volgende vragen gaan over uw ideeën over het gebruik van nieuwe therapievormen, interventies, of behandelingen. Geprotocolleerde therapie verwijst naar elke interventie met specifieke richtlijnen en/of componenten die beschreven staan in een handleiding en/of gevolgd moeten worden op een gestructureerde/vooraf bepaalde manier.

Kruis het rondje aan dat de mate aangeeft waarin u het eens bent met elk item, waarbij u gebruik maakt van de volgende schaal:

0	1	2	3	4
helemaal niet	in beperkte mate	in redelijke mate	in sterke mate	in zeer sterke mate

	0	1	2	3	4
1. Ik gebruik graag nieuwe therapievormen/interventies om mijn cliënten te helpen.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Ik ben bereid om nieuwe therapievormen/interventies te proberen, zelfs als ik een behandelprotocol moet volgen.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Ik weet beter hoe ik voor mijn cliënten moet zorgen dan wetenschappelijk onderzoekers.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Ik ben bereid om nieuwe en andere therapievormen/interventies te gebruiken, die ontwikkeld zijn door onderzoekers.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Op onderzoek gebaseerde behandelingen/interventies zijn niet klinisch bruikbaar.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Klinische ervaring is belangrijker dan het gebruik van geprotocolleerde therapie/behandeling.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Ik zou geen gebruik maken van geprotocolleerde therapie/interventies.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ik zou een nieuwe therapie/interventie proberen, zelfs als die erg zou verschillen van wat ik gewend ben om te doen.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Voor vraag 9-15: Als u training had ontvangen in een therapie of interventie die nieuw voor u was, hoe waarschijnlijk zou het zijn dat u die zou gaan toepassen als:</b>					
9. die intuïtief aantrekkelijk was?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. die 'betekenisvol' voor u was?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. die vereist werd door uw leidinggevende?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. die vereist werd door uw organisatie?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. die landelijk vereist werd?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. die werd gebruikt door collega's die er tevreden over waren?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. u het gevoel had dat u voldoende training had gehad om die correct toe te passen?.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>